


第6回 統計的推定

A. 統計的推定と検定

母集団から無作為抽出した標本から母集団についてなんらかの推論を行う。この場合、統計から行う推論には統計的（ ）と統計的（ ）の2つがある。



推定 統計的に標本の統計量から母集団の母数（母平均，母標準偏差など）を推論することを統計的推定という。

例：視聴率調査を 200 人に対して行い，番組Aの視聴率を推定した。

検定 統計的に標本の統計量から母数に関する予想の真偽を検証することを統計的検定という。

例：視聴率調査を 200 人に対して行い，番組Aの視聴率が 20%以上あるのかを検定した。

例：A社とB社の車の排気ガスに含まれる窒素酸化物はA社の方が多いのかを検定した。


★ 次の文章は統計的推定か，統計的検定かを考えよ。

- ① A牧場の牛から 20 頭を選んで，乳脂肪率を測定し，A牧場の牛全体の乳脂肪率を知りたい。
- ② 番組Bの視聴率を知りたい。
- ③ 窒素施肥量 $10\text{kg}/\text{m}^2$ を与えると，コシヒカリの収量がいくらになるかを知りたい。
- ④ A牧場の牛は去年から飼料をF社からG社に変えた。乳脂肪率が変化したかを知りたい。
- ⑤ 番組Bは番組Cより視聴率が高いのかを知りたい。
- ⑥ 1日当たりの喫煙本数が増えるほど，肺ガンの危険性が増えるのかを知りたい。

わたしたちはふつう（ 母集団 ・ 標本 ）の平均にもっとも関心をいどく。では（ ）の平均から母集団の平均に関する統計的推定，検定をすることができるのであろうか？


B. 標本平均の分布

1. 母集団から無作為に取り出した標本の性質



前回の授業から、標本数が十分に多ければ、母集団の分布によらず、標本平均の分布について、次のことがいえることがわかった。

- ① 母集団の分布にかかわらず、標本分布は（ ）に近い形となった。
- ② 標本の平均は母集団の平均とほぼ（ ）。
- ③ 標本平均の分布は、標本数が（多い・少ない）と大きくばらつき、標本数が（多い・少ない）とあまりばらつかなくなった。



2. 標本平均の分布と中心極限定理


統計的推測のために母集団から抽出した標本数 n の標本から求めた標本平均 \bar{x} の分布は、次の性質を持つ。

- ① 標本平均 \bar{x} の期待値は母平均 μ に等しい。
- ② 標本平均 \bar{x} の分散は母分散 σ^2 の $\frac{1}{n}$ に等しい。したがって、標本平均 \bar{x} の標準偏差(standard deviation, SD)は $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ となる。標本平均の標準偏差を（ ）(standard error, SE)と呼ぶ。
- ③ n が十分に大きいときは大きさ n の標本の標本平均は $N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$ の正規分布に近似できる(中心極限定理という)。
- ④ 標準誤差は標本平均 \bar{x} がどのくらい確実であるかの目安を与える。

標本平均を使って、母集団の平均を推測することから、この標本平均が正規分布に近似できるという特性は重要である。

母集団の標準偏差が小さいほど、あるいはサンプル数を増やすほど標準誤差は小さくなり、標本平均は母集団の平均を推定するときの確実さを増す。

右図のようにかなりゆがんだ分布でも標本平均の分布は標本数 n を十分に増やせば、正規分布に近似できる。したがって、標本数が十分にあれば標本平均から母平均を考える場合、正規分布を使ってよい。



★ 標本平均の分布が正規分布に近似できることから、統計的推定、検定は正規分布を軸に行う。

3. 標準誤差の計算

標本数 n 、標準偏差 SD のとき、標準誤差 SE は

$$SE = \frac{SD}{\sqrt{n}} \quad \text{となる.}$$

例：ある鳥の 100 個の卵の重さを量ったところ、平均 25.3g、標準偏差 3.0g であった。したがって、標準誤差 $SE = \frac{SD}{\sqrt{n}} = \frac{3.0}{\sqrt{100}} = 0.3g$ である。この鳥から 100 個の卵をサンプリングしたとき、標本平均は $N(25.3, 0.09)$ の正規分布に従うと考えられる。

て、標準誤差 $SE = \frac{SD}{\sqrt{n}} = \frac{3.0}{\sqrt{100}} = 0.3g$ である。この鳥から 100 個の卵をサンプリングしたとき、標本平均は $N(25.3, 0.09)$ の正規分布に従うと考えられる。

=3/SQRT(100)		0.3
--------------	--	-----

エクセルによる標準誤差の計算

例：ある鳥の卵 10 個の重さを量ったところ、15.4, 15.8, 15.9, 16.1, 16.2, 16.4, 16.6, 16.8, 16.9, 17.5g であった。平均は 16.4g、標準偏差は 0.6g、標準誤差は 0.2g である。

集めてきたデータそのものから、標準誤差をエクセルで計算するには標準偏差、サンプル数をそれぞれ関数から計算する方法と分析ツールにある基本統計量から計算する方法がある。さらに 100 個以内のデータであれば計算するシートを第 2 回タブのところに作ってある。

	エクセルでの計算式	答え
平均	=AVERAGE(C12:C21)	16.36
標準偏差	=STDEV(C12:C21)	0.613188
サンプル数	=COUNT(C12:C21)	10
標準誤差	=STDEV(C12:C21)/SQRT(COUNT(C12:C21))	0.193907
列1		
平均		16.36
標準誤差		0.193907
中央値 (メジアン)		16.3
最頻値 (モード)		#N/A
標準偏差		0.613188
分散		0.376
尖度		0.00258
歪度		0.336574
範囲		2.1
最小		15.4
最大		17.5
合計		163.6
標本数		10

下の測定値にデータ(100個以内)を入れると平均, 分散, 標準偏差, メジアン, レンジ, 変動係数を自動的に計算する。ただし測定値に値を誤入力したときはDelキーで削除すること。セルを移動させると式が変わってしまう。

標本番号	測定値			
1		平均	#DIV/0!	
2		分散	#DIV/0!	
3		標準偏差	#DIV/0!	
4		メジアン	#NUM!	
5		レンジ	0	
6		変動係数	#DIV/0!	
7		標準誤差	#DIV/0!	
8				
9		標準誤差は第6回で学ぶ		
10				

練習

① 宍道湖で 50 匹のコイの標本を得た。平均体重 3.5kg, 標準偏差 1.2kg だった。この標本の標準誤差を計算せよ。

② 宍道湖で 10 匹のコイの標本を得た。それぞれの体重は 1.3, 1.8, 2.3, 2.9, 3.5, 3.6, 3.8, 4.0, 4.3, 5.1kg であった。この標本の標準誤差を計算せよ。

標本数

標準偏差

標準誤差


標本の標準偏差は標本数を増やしてもほとんど変わらない。一方、標準誤差は標本数を増やしていくと次第に減っていく。このことは池のコイをいくらたくさん取ったとしても、池のコイの体重そのもののばらつきが大きくなったり、小さくなったりすることはないことから、標本の標準偏差そのものが標本数には関係しないことが理解できるだろう。一方、コイをたくさん取れば、池のコイの体重の平均についてはより信頼の得られる値を推定できるだろう。このような信頼の程度を示すのが、標準誤差であり、標本を増やせば、標準誤差が小さくなることが理解できるだろう。

C. 統計的推定

1. 点推定 1つの値で母数を推定する


例：朝酌川で無作為に数地点選び、鯉を釣った。鯉の体重の標本平均 5.0kg なので、朝酌川の鯉の平均体重を 5.0kg と推定した。

しかし、点推定では、推定値がどのくらい信頼できるかを示すことができない。




2. 区間推定 母数がある幅を持つ信頼区間とともに推定する。

例：朝酌川で無作為に数地点選び、鯉を釣った。サンプル数 100 匹の鯉の体重の標本平均 5.0kg 、標準偏差 2.0kg なので、朝酌川の鯉の平均体重は 95% の信頼区間をつけて、 $4.6 \leq \mu \leq 5.4\text{kg}$ と推定した。このとき、母集団（朝酌川のすべての鯉）の母平均は 95% の確率で $4.6 \leq \mu \leq 5.4\text{kg}$ の範囲に入る。




信頼率は統計量を使用する目的に応じて決定する。95%信頼区間の場合、100回のうち5回、区間推定の値に母集団の平均が含まれない（すなわち推定を誤る）ということが起こる。信頼率を高める、例えば100%にしたらいのではないかと考える人もいるかもしれないが、そのときには信頼区間はきわめて大きくなり、役に立たない。例えば、視聴率の100%信頼区間は0~100%だというようなもので、疑いはできないが、この数値では何の役にも立たない。信頼率は必要に応じた大きさを設定する。


標本数 5




標本数 10




標本数 100



標本数 10
信頼率 95%



標本数 10
信頼率 99%




次に実際に信頼区間をつけて標本から母平均を推定してみよう。

① 標本数 n が多いとき (大標本)

標本数 n が多ければ、母集団の標準偏差は標本の標準偏差と同じだと見なしてよい。したがって、標本平均 \bar{x} 、標本標準偏差 s とすると、

$$\text{標準誤差 } SE = \frac{s}{\sqrt{n}}$$

となり、正規分布の性質から 95% の確率で母平均 μ は $\bar{x} - 1.960SE \leq \mu \leq \bar{x} + 1.960SE$ の範囲にあり、99% の確率で $\bar{x} - 2.576SE \leq \mu \leq \bar{x} + 2.576SE$ の間にある。



エクセルの正規分布に関する関数から、信頼率 p % における母平均の区間推定を計算できる。
すなわち標本数 n 、標本平均 \bar{x} 、標本標準偏差 s 、標本の標準誤差 SE とすると、信頼率 p % における区間推定は、

エクセルの関数 $NORMINV$ を利用して、母平均は

$$NORMINV((1-p/100)/2, \bar{x}, SE) \leq \mu \leq NORMINV(1-(1-p/100)/2, \bar{x}, SE)$$

あるいは

$$NORMINV((1-p/100)/2, \bar{x}, s/\sqrt{QRT}(n)) \leq \mu \leq NORMINV(1-(1-p/100)/2, \bar{x}, s/\sqrt{QRT}(n))$$

と計算できる。

例 100 個のトマトの重さを量ったときに平均 120.00g、標準偏差 10.00g だった。95%信頼区間と 99%信頼区間をつけて母平均を区間推定せよ。

$$95\% \text{信頼区間} \quad 120 - 10/\sqrt{100} \times 1.960 \leq \mu \leq 120 + 10/\sqrt{100} \times 1.960$$

$$118.04 \leq \mu \leq 121.96$$

$$99\% \text{信頼区間} \quad 120 - 10/\sqrt{100} \times 2.576 \leq \mu \leq 120 + 10/\sqrt{100} \times 2.576$$

$$117.42 \leq \mu \leq 122.58$$

前述のトマトの例をエクセルで計算すると以下のようなになる。

95%信頼区間をつけた区間推定

=NORMINV((1-95/100)/2,120,10/SQRT(100))	118.04
=NORMINV(1-(1-95/100)/2,120,10/SQRT(100))	121.96

99%信頼区間をつけた区間推定

=NORMINV((1-99/100)/2,120,10/SQRT(100))	117.4242
=NORMINV(1-(1-99/100)/2,120,10/SQRT(100))	122.5758

あるいは値を代入するだけで計算するように作ったセルへ代入してもよい。

標本数, 標本平均, 標本標準偏差, 信頼率を入力すると信頼区間を計算するように以下のシートは作ってあります。 適当なセルへコピーして使用してください。				標本数	100
標本数				標本平均	120
標本平均				標本標準偏差	10
標本標準偏差				信頼率	95 %
信頼率		%		上限	118.04
上限	#DIV/0!			下限	121.96
下限	#DIV/0!				

練習 100個のトマトの重さを量ったときに平均 120.00g, 標準偏差 10.00g だった. 90%信頼区間をつけて母平均を区間推定せよ.

★ 信頼率としては 95%あるいは 99%を使うことが多いので, 信頼率 95%の信頼区間の式 $\bar{x} - 1.960S.E. \leq \mu \leq \bar{x} + 1.960S.E.$ および信頼率 99%の信頼区間の式 $\bar{x} - 2.576S.E. \leq \mu \leq \bar{x} + 2.576S.E.$ を覚えておくと便利である.

② 標本数 n が少ないとき (小標本)

このときは標本の標準偏差 s から母集団の標準偏差 σ を推定する誤差が大きいため, 正規分布ではなく t 分布で推定する. 詳細は第 8 回の授業で行う.

D. 宿題

宿題はホームページ <http://www.ipc.shimane-u.ac.jp/food/kobayasi/biometrysyukudai.html> を見てください.