

種子の発芽試験調査用紙 (1班)

	2010A	2009A	2008A	2008D	2006D	2004D	2008C	2004C	2000C	1995C	調査した人	気づいた点
12月10日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	伊東	
12月11日											伊東	
12月12日											伊東	
12月13日	50	0	0	0	32	1	50	10	0	49	大畑	
12月14日	50	0	0	0	40	10	50	20	0	49	石井	2006D, 2000C 各1粒
12月15日	50	0	0	0	40	12	50	35	0	50	菊川	2004C 各1粒
12月16日	50	0	0	0	45	14	50	37	3	50	川上	
12月17日	50	0	0	0	37	14	50	22	4	50	伊東	79が入れかたのかわりませんが、数が多い 大畑に減らすといい感じ
12月18日	50	0	0	0	45	14	50	22	4	50	石井	2000C 各10粒
12月19日		0							*	50	伊東	1995C 各1
12月20日	50	0	0	0	45	14	50	19	4	50	石井	1995C 各1 2000C 各4 2008C 各7(各11) 2006D 全体的に
12月21日											伊東	
12月22日	50	0	0	0	40	15	7	20	5	50	菊川	2006D 各1粒 2000C 各5 2008C 各3 2004D 各10 2010A 各10
12月23日	50	0	0	0	12	15	87	19	3	50	川上	乾燥 = 各10粒程度

2006 D は 1粒カビてたので 49粒

種子の発芽試験調査用紙 (4班)

	2010A	2009A	2008A	2008D	2006D	2004D	2008C	2004C	2000C	1995C	調査した人	気づいた点
12月10日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	脇	2000Cは他のものと比べてかなり黒い。
12月11日	22	0	#0	26	3	0	17	0	0	0	吉林	
12月12日	48	0	0	49	31	8	50	10	0	0	藤江	
12月13日	50	0	0	80	43	0	50	11	0	0	吉田	
12月14日	50	0	0	50	43	6	50	17	0	0	脇	2004Dは全体的にはカビが生えていない。
12月15日	50	2	1	50	44	12	50	19	1	1	山本	2=カビはえた(2006D) ↑は発芽
12月16日	50	3	1	50	48	12	50	25	1	1	吉田	
12月17日	50	3	1	50	48	12	50	25	1	1	脇	
12月18日	50	3	1	50	48	12	50	25	1	1	吉林	2009Aはカビ
12月19日	45	4	1	50	48	13	49	22	1	1	吉田	2010Aカビ75%程度は全体的にカビが生えていない 2008C " 17% " カビが生えていない
12月20日	45	4	1	50	48	13	50	25	1	1	横山	
12月21日	45	4	1	50	48	13	49	25	1	1	吉田	2004Dのカビがほとんど全体的に生えてもカビは少ない、COOLのものはカビが生えていない。
12月22日	45	4	1	50	48	13	49	25	1	1	山本	
12月23日	45	4	1	50	48	13	49	25	1	1	藤江	