

種子の発芽試験調査用紙 (1回生・1班)

	2011A	2010A	2009A	2009D	2007D	2005D	2009C	2006C	2003C	調査した人	気づいた点
1月10日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	大原, 岩崎	特化はなから。
1月11日	40	0	0	31	13	2	49	0	0	大谷, 岡田	2005Dにカビが生えた。(大谷) 2006C " " 17。(岡田)
1月12日	45	3	1	50	35	5	49	7	19	岡田, 大谷	2009Dは全て発芽していた。水不足に注意。(岡田) 2006Cにカビが生えた。(大谷)
1月13日	46	12	0	50	44	38	49	13	21	小川内, 磯本	2006Cにカビが生えた。(小川内) 2005Dのカビを 2009Aの発芽数から減らす(磯本) 17除去(磯本)
1月14日	47	17	0	50	45	41	49	26	27	川合	発芽が来ていていらないカビ
1月15日	50	21	1	50	47	47	49	36	32	岩崎	2007Cにカビが生えた。
1月16日	50	30	2	50	47	46	49	39	38	川合, 石田	2005Dにカビ1つ
1月17日											
1月18日	56	34	2	50	46	46	49	38	38	大原, 磯本	2005Dのカビ1つ除去 2006Cのカビ1つ除去
1月19日											
1月20日											
1月21日	13	15	10	12	35	20	14	11	33	小川内, 大谷	カビが大量に増殖していたため除去
1月22日											
1月23日	9	6	10	12	30	15	14	10	28	岡田	カビの大量発生により除去を行った。

種子の発芽試験調査用紙 (1回生・2班)

	2011A	2010A	2009A	2009D	2007D	2005D	2009C	2006C	2003C	調査した人	気づいた点
1月10日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	木佐公香	まだなににもない
1月11日	38	0	0	41	19	0	49	3	3	川端千紘	発芽しているかわかりにくい……
1月12日	42	4	0	50	33	5	49	7	8	喜多	細かいものがあり、 カウントがしにくかった。
1月13日	44	7	0	50	48	30 ²⁰	50	15	17	木下晋吾	若干発芽している or 発芽してか、かわかりにくい
1月14日	45	23	0	50	49	45	50	23	25	桐村	少しだけ白いものがある
1月15日	46	25	/	50	49	45	50	23	29	桐村	2005Dにカビがはえていた
1月16日	46	26	/	50	49	45	50	23	29	木下	2010年11月、2007年に10、2005年全滅 2009年カビがはえて、2006、2003はエ。
1月17日	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
1月18日	48	27	1	50	49	45 (測定不能)	50	23	29	喜多	2009D、Cにカビがはえていた 発芽していないものが多い
1月19日	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
1月20日	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
1月21日	48(5)	27(2)	1(2)	50(2)	49(1)	45(0) 全滅	50(2)	23(1)	29(3)	川口	全部の種にカビが生えていたので、数値除き (1)の中が除いた数です
1月22日	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
1月23日	43 ^{カビ} (10)	25(15)	1(0)	50	49(1)	45 ^{カビ} 全滅	50	23(20)	19(23)	木下	もはや、わからん……。カビがはもはやして除いた。 黒く変色したものは原因不明。 白くドボドボしたものも存在し、断定不可。 あと、異臭がハンパない……

カビの
発生あり

↑
白くドボドボしている

↑
カビのせいかわからない
一部黒く変色

↑
白くドボドボしたもの、カビ？
と判断した

種子の発芽試験調査用紙 (1回生・3班)

	2011A	2010A	2009A	2009D	2007D	2005D	2009C	2006C	2003C	調査した人	気づいた点
1月10日	0	0	0	0	0	0	5	0	0	平野・福元	2009Cから5つ発芽していた。
1月11日	24	0	0	25	7	0	35	0	0	福元・多田	2005Dに1つカビが生えた種子が見えた。
1月12日	44	1	0	49	42	11	49	9	16	野津・東根	2009A以外すべて発芽していた。
1月13日	45	6	0	49	42	34	49	20	17	福元・原	2006C11つカビが生えていた。
1月14日	45	9	0	49	44	42	49	27	24	原・小谷	2011Aの米の1つにカビが生えていた。
1月15日	46	13	0	49	44	43	49	27	37	原・東根	2006C 2005Dの発芽した米からカビが見つかった。
1月16日	47	17	0	49	44	43	49	28	37	原・東根・多田	2006C, 2005Dからカビが多く発生していた。 2007Dにカビ1つ。
1月17日											
1月18日	48	23	0	37	46	23	14	28	37	野津・平野	2009D 13コカビ 2005D 27コカビ 2006C 15コカビ 2007D 17コカビ 2009C 35コカビ
1月19日											
1月20日											
1月21日	27	33	0	27	32	11	1	16	26	小谷・多田	2009D 8コカビ 2006C 4コカビ 2009C 15コカビ 2007D 11コカビ 2005D 14コカビ 2011A 19コカビ 2005D 10コカビ
1月22日											
1月23日	13	18	0	22	30	10	1	16	25	3班全員	全体的にカビが増えていた。

種子の発芽試験調査用紙 (1回生・4班)

	2011A	2010A	2009A	2009D	2007D	2005D	2009C	2006C	2003C	調査した人	気づいた点
1月10日	0	0	0	5	0	0	0	0	0	吉田 美	も発芽しているものがあつた。
1月11日	30	1	0	43	13	1	37	1	1	藤島 尚也	2009年のものがたくさん芽出た。
1月12日	44	1	0	49	19	2	50	6	9	山岡 堇子	2009Cに長い根が出ているものがあつた。
1月13日	47	4	0	50	46	14	50	9	17	金 明典	2005Dにカビが... 2006Cにもカビが... カビ... とりおろす。2006Cから2007C、2009Aは発芽しない。
1月14日	49	7	0	50	48	24	50	18	23	吉岡 伸裕	発芽していないものでも、水の吸い取りは かなりある。(ex: 2010A)
1月15日	49	9	0	50	48	32	50	33	29	藤田 有里	カビが生えているものがあつた。
1月16日	49	19	0	50	48	33	50	33	41	牧野 真太郎	カビや黒くなっているものが取り除かれた。
1月17日											
1月18日	50	35	0	50	48	35	50	35	43	山岡 堇子	カビが生えているものがあつた。
1月19日											
1月20日											
1月21日	34	27	0	41	43	23	43	16	34	本多 尚	2003Cの水気が高く育ちすぎて、 カビが大量にあつたため除去。
1月22日											
1月23日	32	11	0	29	33	18	43	4	32	藤原 宏行	カビが繁殖していて、黒くなっているものがあつた。